

NOTE ADDITIONNELLE

A LA PREMIÈRE

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE NATURELLE DU MEXIQUE

Par **F. SUMICHRAST**

(Séance du 11 octobre 1881)

Comme je crois qu'il est toujours utile de compléter un travail antérieur, je saisis l'occasion d'ajouter ici quelques nouvelles espèces à la liste des Reptiles et Batraciens de l'Isthme de Tehuantepec, publiée dans le *Bulletin de la Société Zoologique de France* pour l'année 1880.

SAURIENS.

Diploglossus (Celestus) Chatybæus Cope, *American Philos. Soc.* 1879. Ce Scincoïdien, que j'avais d'abord trouvé il y a fort longtemps dans l'État de Veracruz, habite aussi l'Isthme dans les forêts au Nord de Santa Efigenia.

OPHIDIENS.

Coniophanes proterops Cope. J'ai retrouvé ce serpent, décrit originairement sur des exemplaires recueillis à Jalapa (Veracruz), dans les environs de Tapaná, à l'extrémité méridionale de l'État de Oaxaca.

BATRACIENS.

Ædipus rufescens Cope. Ce très petit Urodèle dont j'avais, il y a plusieurs années, recueilli des échantillons dans la région alpine d'Orizaba, habite aussi les forêts des bords du Pacifique, à quelques lieues au Nord de Santa Efigenia : je l'y ai trouvé au milieu des touffes de *Tillandsia epiphytes*, à une hauteur de 800 à 1,000 mètres, sur les flancs du Cerro Prieto.

Ædipus carbonarius Cope. Des mêmes localités que l'espèce précédente : vit sous les troncs pourris et les écorces ; il est commun sur la côte du golfe du Mexique, jusqu'à une altitude d'au moins 2,500 mètres.

Bufo coccifer Cope.

De Cacoprieto.

Hyla myotympanum Cope.

C'est encore une espèce qui habite aussi l'État de Veracruz, où elle est commune, et qui se retrouve à Santa Efigenia, sur le versant opposé.

Hylella platycephala Cope.

Ce petit Batracien est, d'après M. le professeur Cope, l'unique représentant du genre *Hylella* dans le district mexicain de la région néotropicale. J'ai trouvé autrefois, dans les montagnes d'Orizaba, une espèce probablement identique à celle de l'Isthme et vivant, comme cette dernière, au milieu des touffes de *Tillandsia* : les larges feuilles de ces plantes servent de réservoir à la rosée et durant toute l'année contiennent une quantité d'eau suffisante pour fournir aux besoins qu'ont de cet élément les *Hylella* et les petites espèces de *Spelerpes* et de *Geotriton* qu'on y trouve presque toujours en compagnie de divers *Blattides*, de *Carabiques* et de *Myriapodes*. J'ai pu m'assurer par la dissection qu'un oiseau de la région alpine, le *Xiphocolaptes emigrans* Sclater, ne laisse pas, quoique insectivore par nature, de vivre aussi aux dépens des *Hylella* qu'il enlève facilement du milieu des touffes de *Tillandsia*, au moyen de son long bec. A l'état vivant, l'*Hylella platycephala* est un petit être fort mou, fort délicat, presque transparent et dont la modeste livrée n'est relevée que par la belle couleur d'or de ses yeux. L'aplatissement excessif de la tête et du corps de ce petit animal s'adapte merveilleusement à l'étroitesse de son domicile aérien, où il subit *peut-être* ses métamorphoses.

Lithodytes podiciferus Cope.

Ce petit Anoure, très variable en couleur, est assez commun sur le bord des torrents de montagne : il se tient sous les feuilles humides ou sous les troncs à demi-submergés d'où il se jette à l'eau à la moindre apparence de danger.

Syrrhophus leprus Cope.

Ce Batracien, génériquement voisin des *Phyllobates* et de très petite taille, vit dans les mêmes lieux que le précédent, sous les souches et les feuilles humides ; il est rare.

Cystignathus perlævis Cope.

J'ai retiré cette espèce d'un puits près de Tapana.

Cystignathus labialis Cope. C'est au moment des grandes pluies que cette espèce se trouve avec quelque abondance dans les ornières creusées par la pluie ou par le passage des charrettes ; en toute autre saison on le trouve sous les amas de pierres au bord des ruisseaux.

Tonalá, juin 1881.

Paru le 25 décembre 1881.